

個別接種の予防接種一覧

予防接種名	対象年齢・回数等
ロタ	<p>(標準的接種開始年齢) 生後2か月から生後14週6日まで ロタリックス2回(生後6週0日から24週0日までに27日以上の間隔) ロタテック3回(生後6週0日から32週0日までに27日以上の間隔) ◎1回目に接種したものと同一ワクチンで接種を完了してください。</p>
B型肝炎	<p>1歳未満(標準的な接種期間) 生後2か月～9か月未満 3回接種 1回目: 生後2か月以降 2回目: 1回目の接種から27日以上の間隔 3回目: 1回目の接種から139日以上の間隔</p>
小児用肺炎球菌 (15価、20価)	<p>生後2か月～5歳未満(標準的接種開始年齢) 生後2か月以上7か月未満 初回3回(27日以上の間隔で1歳未満のうちに3回) 追加1回(初回終了後60日以上あけて、1歳になってから1回) (接種回数は接種開始年齢によって異なります。詳しくは、お問い合わせください)</p>
5種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ・ヒブ)	<p>1期: 生後2か月～7歳6か月未満(標準的な接種期間) 生後2か月～7か月までに開始 初回3回(20日から56日までの間隔) 追加1回(初回接種終了後6か月から18か月までの間隔をあけて)</p>
2種混合(ジフテリア・破傷風)	<p>2期: 11～13歳未満 1回(ジフテリア・破傷風)</p>
麻しん・風しん混合(M・R)	<p>1期: 1～2歳未満 1回 2期: 小学校就学前1年間 1回(年長児の4月1日から3月31日まで)</p>
水痘(水ぼうそう)	<p>1～3歳未満 2回 ※標準的には、1歳～1歳3か月に至るまでに初回接種を行い、追加接種は初回接種終了後6～12か月あけて3歳未満で接種する(医師と相談の上、3か月以上あけての接種は可能)</p>
日本脳炎	<p>1期: 3～7歳6か月未満 初回2回(6日から28日までの間隔) 追加1回(1年後) 2期: 9～13歳未満 1回 特例措置 平成7年4月2日から平成19年4月1日生まれの人は、1期初回2回、追加1回、2期1回(2期は9歳以上)のうち不足回数分を20歳未満で接種できます。</p>