個別接種の予防接種一覧	
予防接種名	対象年齢・回数等
ロタ	（標準的接種開始年齢）生後２か月から生後１４週６日まで ロタリックス２回（生後６週０日から２４週０日までに２７日以上の間隔） ロタテック３回（生後６週０日から３２週０日までに２７日以上の間隔） ◎１回目に接種したものと同じワクチンで接種を完了してください。
B型肝炎	１歳未満（標準的な接種期間）生後２か月～９か月未満 ３回接種 １回目：生後２か月以降 ２回目：１回目の接種から２７日以上の間隔 ３回目：１回目の接種から１３９日以上の間隔
小児用肺炎球菌 （１５価、２０価）	生後２か月～５歳未満（標準的接種開始年齢）生後２か月以上７か月未満 初回３回（２７日以上の間隔で１歳未満のうちに３回） 追加１回（初回終了後６０日以上あけて、１歳になってから１回） （接種回数は接種開始年齢によって異なります。詳しくは、お問い合わせください）
５種混合（ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ・ヒブ）	１期：生後２か月～７歳６か月未満（標準的な接種期間）生後２か月～７か月までに開始 初回３回（２０日から５６日までの間隔） 追加１回（初回接種終了後６か月から１８か月までの間隔をあけて）
２種混合（ジフテリア・破傷風）	２期：１１～１３歳未満　１回（ジフテリア・破傷風）
麻しん・風しん混合 （M・R）	１期：１～２歳未満　１回 ２期：小学校就学前１年間　１回（年長児の４月１日から３月３１日まで）
水痘（水ぼうそう）	１～３歳未満　２回 ※標準的には、１歳～１歳３か月に至るまでに初回接種を行い、追加接種は初回接種終了後６～１２か月あけて３歳未満で接種する（医師と相談の上、３か月以上あけての接種は可能）
日本脳炎	１期：３～７歳６か月未満 初回２回（６日から２８日までの間隔）　追加１回（１年後） ２期：９～１３歳未満　１回 特例措置　平成７年４月２日から平成１９年４月１日生まれの人は、１期初回２回、追加１回、２期１回（２期は９歳以上）のうち不足回数分を２０歳未満で接種できます。
BCG	１歳未満　１回 ※標準的には、生後５か月～８か月に至るまでに接種